

النصائح الإرشادية الزراعية



شهر تموز

- (1) إلى الإخوة مزارعي الفستق الحلبي: يتوجب عليكم تقديم الري التكميلي للأشجار عند الحاجة.
- (2) إلى أصحاب الزراعات المحمية: بادروا إلى التعقيم الشمسي لتربة البيوت المحمية وفق الخطوات التالية:
 - تنظيف الأرض جيداً من بقايا المحصول السابق.
 - حراثة عميقة للتربة.
 - ري التربة لدرجة الإشباع. وعندما تصبح التربة مستحترثة يضاف السماد العضوي المتخمر ويغمر.
 - تغطى التربة بشريحة بلاستيكية شفافة وتحكم أطرافها.
 - يعاد ترطيب التربة 3-5 م³ من المياه أسبوعياً لمدة 6 أسابيع، وذلك للمحافظة على رطوبة التربة 50 - 70 % من السعة الحقلية.
 - إزالة البلاستيك بعد نهاية فترة التعقيم مع عدم تحريك التربة أو خلطها بعد التعقيم حتى لا تتدنى فعالية التعقيم.
- (3) زراعة العروة الخريفية لمحصول البطاطا خلال الفترة من منتصف تموز وحتى منتصف آب.
- (4) أخي مربى النحل: قم بتهوية خلايا النحل وإضافة إطارات لمنع الازدحام وتوفير الماء النظيف للمنحل.
- (5) استمرار تطعيم أشجار الزيتون واللوزيات.
- (6) يجب الانتهاء تماماً من عمليات دراس محصول العدس بعد أن يتم تجفيفه تحت أشعة الشمس.
- (7) استكمال حصاد محصول الحمص وخاصة الشتوي.
- (8) بدء نضج محصول البصل الصيفي البلدي بعد 15 تموز، والبدء بغطاه استعداداً لقلعه مع نهاية الشهر الحالي.
- (9) تأمين الاحتياج الأعظمي لمحصول القطن من الري في شهري تموز وآب بشكل ريات خفيفة ومتقاربة مع تجنب الري بالغمر.
- (10) إطلاق العدو الحيوي التريكوغراما لمكافحة ديدان اللوز على القطن.
- (11) تتأثر الأبقار والنعاج بالحرارة، لذلك يجب أن تستريح خلال فترة الظهيرة تحت مظلات مناسبة.
- (12) تبدأ زراعة الكوسا والخيار كعروة خريفية في منتصف هذا الشهر.
- (13) يجب تلقيح البكاكير عند وصولها عمر النضج الجسمي نحو 315 كغ أو الجنسي بعمر 15 شهراً.

- (14) الاستمرار بمكافحة عشبة الباذنجان البري بقلعها يدوياً أو فلاحتها قبل مرحلة الإثمار ثم جمعها وحرقها خارج الحقل، ويمكن مكافحتها كيميائياً بالمبيدات المناسبة.
- (15) يجب عدم حرق بقايا المحاصيل الزراعية (القمح والشعير) والعمل على جمع مادة القش وكبسها لتغذية حيوانات المزرعة عند الحاجة أو معاملتها باليوريا لرفع قيمتها الغذائية.
- (16) يجب عليك أخي الفلاح اتباع الإجراءات التالية للوقاية من الإصابة بمرض ذبول الزيتون والحد من انتشاره:
 - أخذ العقل الغضة من أشجار سليمة وموثوقة الصنف.
 - تجنب الفلاحة العميقة والإقلال منها والاتجاه نحو نهج الزراعة الحافظة.
 - التسميد المتوازن.
 - استخدام العدو الحيوي /فطر التريكوديرما/ وذلك بإضافته للتربة بعد مراجعة الوحدة الإرشادية ودائرة الوقاية في منطقتك لطلبه والحصول عليه.
 - (17) ذبابة ثمار الزيتون: استخدام المصائد الجاذبة بمعدل 5/ مصائد لكل دونم، مع ضرورة تبديل المحلول كلما لزم الأمر للتحري عن الإصابة بذبابة ثمار الزيتون.
 - (18) دودة ثمار التفاح: تعليق المصائد الفرمونية الجاذبة التي تساعدك في تحديد موعد انتشار دودة ثمار التفاح والتوقيت الملائم لمكافحتها.
 - (19) إجراء التقليم الصيفي لشجرة التفاح.
 - (20) أخي الفلاح عليك بنشر الأعداء الحيوية في بساتين أشجار التفاح وذلك من خلال إطلاق الأعداء الحيوية / البراغون- أسد المن - والتريكوغراما/ وهي أعداء حيوية واسعة الطيف وتتغذى على عشرات الحشرات الضارة لمراجعة الوحدة الإرشادية ودائرة الوقاية في منطقتك لطلبها والحصول عليها.
 - (21) أخي الفلاح: يسبب فأر الحقل خسائر كبيرة للمحصول المزروع يمكنك مكافحته بالطرق التالية:
 - فلاحه الأرض الحصيد والبور.
 - إتلاف الأعشاب على جوانب الطرقات والسواقي والمصارف.
 - استخدام المصائد التنكية على أطراف الحقول المزروعة بالمحاصيل الخريفية.
 - استخدام الطعوم السامة في الجحور الفعالة وذلك بعد فحصها واختبارها.

شهر آب

- (1) إزالة الطرود الشحمية المائية عن الأشجار وخاصة التفاحيات.
- (2) أحي المزارع: بادر إلى قلع نباتات الهالوك من الحقل إن وجدت على نباتات المحاصيل الخضرية /بادنجان - بندورة - بطاطا - كوسا/.
- (3) أحي مربى الدواجن: بادر إلى تأمين التهوية الجيدة للحظيرة مع تأمين مشارب الماء النظيف بشكل مستمر للصيصان، مع إضافة الأملاح المعدنية والفيتامين C/ إلى مياه الشرب.
- (4) تأمين الاحتياجات المائية لشجرة الزيتون خلال شهري آب وأيلول نظراً لكبر حجم الثمار.
- (5) القيام بعملية قطف البطيخ الأصفر والأحمر.
- (6) تبدأ عملية قطف الفستق الحلبي نهاية شهر آب.
- (7) إلى الإخوة مزارعي البطاطا: بادروا إلى استجرار حاجتكم من بذار البطاطا المحلية المعتمدة لدى المؤسسة العامة لإكثار البذار لما تتميز به من إنتاجية وجودة عاليتين وخلوها من الأمراض.
- (8) تجنب حراثة التربة في الأراضي الزراعية البعلية قبل حلول موسم الأمطار، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منها ومنعاً لجريانها السطحي وانجراف التربة.
- (9) إن الإسراف في ري محاصيل الخضار الثمرية يؤدي إلى زيادة في النمو الخضري وتساقط الأزهار وانتشار الأمراض الفطرية.
- (10) أحي المزارع: إن توريق الذرة الصفراء وإزالة الأوراق السفلية تقلل من الإنتاجية.
- (11) التوقف عن ري حقول القطن عندما يبلغ عدد الجوزات الكامل على النبات 80-90% من مجموع الثمار وذلك حتى لا يتأخر نضج القطن وتتضرر الأقطان.
- (12) تضييق مداخل خلايا النحل إضافة إلى توزيع مصائد شبكية في المنحل وتوزيع قطع كرتونية مطلية بمادة لاصقة تتوسطها قطع من اللحم المتفسخ للحد من أضرار الدبور الأحمر.
- (13) تخضع الأشجار الحراجية المزروعة كمصدات رياح لرخصة قلع وقطع ونقل مأجورة من الوحدة التنظيمية في المنطقة. /المادة 40 فقرة ب/ من فصل الحراج الخاصة.
- (14) أحي المزارع: عند استعمالك طرق الري الحديثة بإمكانك توفير حتى 50% من كمية مياه الري المضافة وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاجية.
- (15) يجب تبخير أقراص العسل بعد فرزها وتنظيفها وذلك في حيز مغلق بوساطة غاز الكبريت.
- (16) ري البطاطا في الفترتين الحرجتين الأولى عندما تبدأ الدرناات بالتكون حيث قلة الري في هذه الفترة يقلل من عددها والفترة الثانية عند بدء الدرناات بالنمو، حيث إن قلة الري في هذه الفترة يؤدي إلى نقص في الإنتاج.
- (17) إن التغذية غير المتوازنة المقدمة للأبقار من حيث الكمية والنوعية يؤدي إلى أضرار صحية

وانخفاض في إنتاج الحليب وبالتالي إلى انخفاض في الدخل والربح.

18. الاستمرار بري حقول القطن خلال شهر الحر الشديد.
19. التقيد بالشروط الصحية والفنية عند استخدام المياه المعالجة والناجمة عن الصرف الصحي لري المحاصيل.

شهر أيلول

- (1) أحي مزارع القطن تبدأ عملية فطام القطن ابتداء من منتصف أيلول، والبدء بعملية القطف عند تفتح 60 - 70% من الجوز.
- (2) الاستمرار بعملية قطف الفستق الحلبي.
- (3) إجراء فلاحه خريفية لزراعة الثوم، والبدء بالزراعة ابتداء من 15/ أيلول في المناطق الداخلية.
- (4) القيام بعملية تفريد نبات الكوسا بعد 20/ يوماً من الزراعة الخريفية المتأخرة.
- (5) الذرة البيضاء من المحاصيل المهمة، نظراً لأنها تستطيع أن تنمو في المناطق قليلة الأمطار وتحمل ارتفاع الملوحة في التربة، وتستخدم أساساً في تغذية الدواجن.
- (6) إجراء الفلاحات المناسبة لزراعة محصول الشعير.
- (7) عدم الإبقاء على زراعة الفريز أكثر من ثلاث سنوات لأن المحصول يقل، وتتدنى مواصفات الثمار.
- (8) القيام بوضع فحول الماعز مع الإناث خلال شهر أيلول لتكون الولادات خلال شهر شباط.
- (9) الاستمرار بقلع محصول البطاطا الصيفية.
- (10) انتخاب نعاج متأقلمة مع ظروف البيئة الجافة /البادية السورية/.
- (11) الاستمرار بري الحمضيات خلال شهري أيلول وتشرين الأول حتى موعد سقوط الأمطار.

شهر تشرين الأول

- (1) الاستمرار بعملية قطف الفستق الحلبي.
- (2) الاستعداد لزراعة القمح باستكمال عمليات فلاحه التربة وتهيئتها وتنعيمها وتسويتها وإضافة السماد الفوسفوري.
- (3) الاستمرار بعملية قطف القطن حتى نهاية الشهر مع الانتباه لعدم خلط القطفات والأقطان، وذلك للمحافظة على جودة القطن المقطوف.
- (4) تعبئة القطن في شلول نظامية وعدم استخدام خيطان قنب أو نايلون لأنها تسيء إلى نوعية القطن المسوق.
- (5) البدء بزراعة الشعير بعد منتصف الشهر.
- (6) يزرع الشوندر السكري للعروة الخريفية اعتباراً من 10/15 ولغاية 11/15 إما تقيباً أو بالبذرة.
- (7) متابعة زراعة الفول في المناطق الدافئة وحصاده في المناطق الباردة.
- (8) القيام بتقليم أظلاف الأبقار بصورة دورية يزيد إنتاجها من الحليب.

(13) تقطف ثمار الحمضيات عند نضجها الذي يتحدد بأخذ الثمار للحجم الطبيعي للصف واللون والطعم المميز.

شهر كانون الأول

(1) أخي مربي الفستق الحلبي: إن حشرة خنفساء القلف تقضي فصل الشتاء في التربة على شكل حشرة كاملة، وللقضاء عليها يمكنك اللجوء لتطويق الأرض.

(2) أخي مربي الفروج: قم بالتحضير لبرودة الشتاء، بزيادة سماكة الفرشة وتقليبها باستمرار منعاً لانتشار الرطوبة، وتفقد الأسقف والجدران، وحفظ وتخزين الأعلاف بشكل جيد.

(3) تتم زراعة غراس الزيتون اعتباراً من شهر كانون الأول.

(4) يفضل زراعة غراس الفستق الحلبي المطعمة مباشرة في الحقل لاختصار الوقت اللازم لدخولها في طور الإثمار مع اختيار الغراس معروفة المصدر من حيث الأصل والصف.

(5) استكمال عملية زراعة القمح بالأصناف المغربية والمعقمة والمعتمدة والمناسبة لمنطقتك.

(6) الاستمرار بعملية زراعة الشعير.

(7) زراعة الحمص الشتوي بمناطق الاستقرار الأولى والثانية، والاعتماد على الأصناف المعتمدة والمعقمة في الزراعة.

(8) إجراء فلاحة عميقة لتحضير الأرض لزراعة السمسم.

(9) يزرع العدس في النصف الثاني من هذا الشهر، وتسمد الأرض بالسماذ الفوسفاتي قبل الزراعة أو معها.

(10) البدء بزراعة العروة الربيعية للبندورة.

(11) تحضير التربة لزراعة العروة الربيعية للبطاطا وذلك بإضافة الأسمدة NPK وخلطها بالتربة وتسوية الأرض وتهيتها.

(12) أخي مربي الأبقار: إن التدرج في تغيير نوع العليقة المقدمة يمنع حدوث اضطرابات هضمية ويحمي من انخفاض الإنتاج، إضافة إلى أضرار صحية أخرى.

(13) عند وجود طوائف ضعيفة في المنحل تضم كل طائفتين أو ثلاث بعضها إلى بعض لتتمكن من المحافظة على حياتها خلال فصل الشتاء.

(14) أخي المربي: حين ينعدم العلف الأخضر خلال فصل الشتاء يُعد دريس الفصة من أهم المواد العلفية التي يمكن تقديمها للحيوانات.

(15) أخي المربي: يمنع منح رخص رعي الماعز والإبل في الحراج والأراضي الحرجية/الفقرة ب من المادة /18/ فصل إعطاء رخص الانتفاع في حراج الدولة/ ❖

إعداد: م. محمد أحمد البحري

مديرية الإرشاد الزراعي

(9) البدء بعملية جني الملفوف اعتباراً من منتصف الشهر.

(10) فرز القزح التالف والمنبت للبصل المخزن للزراعة الصيفية.

(11) البدء بعملية جني العروة الخريفية للفاصولياء.

(12) الانتهاء من حصاد السمسم للزراعة المتأخرة الصيفية والخريفية.

(13) البدء بحصاد الفول السوداني مع بداية الشهر.

(14) الاستمرار بجني البندورة.

(15) تقديم الدعم العلفي لقطعان الأغنام حيث يرتبط إنتاج الحليب بتقديم العلف المناسب والكافي وخاصة خلال سنوات الجفاف.

(16) بدء المعالجة الخريفية لفاروا النحل مع النصح باستخدام المواد الطبيعية المعتمدة.

(17) تقطف ثمار الزيتون عندما تدخل في مرحلة النضج الكامل، وبالتحديد عندما تكون أكثر من 60% من الثمار باللون الأسود.

(18) يجب تنظيف ثمار الزيتون من الأوراق قبل العصر لأنها تكسب الزيت الطعم المر.

شهر تشرين الثاني

(1) تجفيف ثمار الفستق وتخزينها بظروف مثالية تجنباً للتعفن.

(2) التبريد بزراعة العدس والحمص الشتوي بمعدل 12 كغ/دونم.

(3) ينصح بزراعة القمح اعتباراً من شهر تشرين الثاني ولغاية 15 كانون الأول مع إضافة الدفعة الأولى من السماذ الأزوتي.

(4) من أهم عوامل نجاح زراعة القمح البعل: التبريد بالزراعة، التسميد، مكافحة الأعشاب، الحصاد المبكر.

(5) البدء بعمليات مكافحة فأر الحقل والأعشاب الضارة.

(6) الاستمرار بعملية زراعة الشعير.

(7) تهيئة التربة لزراعة الحمص الشتوي وإضافة الأسمدة الفوسفاتية.

(8) الاستمرار بزراعة العروة الخريفية للشوندر السكري.

(9) الاستمرار بعملية جني محصول الملفوف.

(10) أخي مربي الأغنام: إن الدفع الغذائي أثناء الحمل يهدف إلى زيادة نسبة الولادات الحية وتقليل نسبة الولادات الضعيفة وزيادة إنتاج كمية الحليب وتحسين مواصفاته.

(11) أخي مربي الأبقار الحلوب: عليك القيام بفحص دوري للأبقار للتحرّي عن مرض التهاب الضرع تحت السريري بوساطة اختبار كاليفورنيا، ويمكن إجراء اختبارات مخبرية للتحرّي عن الالتهاب الصامت.

(12) عند التخلص من عبوات المييد الفارغة قم بتجميعها في أماكن مخصصة للتخزين وحاول غسلها بمكان آمن قبل التخلص منها ولا تسكب المييدات أو ماء الغسيل في مياه الصرف الصحي. واغسل يديك جيداً بالماء والصابون.