

النصائح الإرشادية للبق الأول لعام ٢٠٢٣

الجائر على أشجاركم في المواقع التي تتعرض للصقيع، واستبدال زراعة أصناف الزيتون الحساسة للصقيع بأصناف أخرى أكثر تحملاً.

أخي مزارع الحمضيات استخدم المصائد اللونية والضوئية والغذائية والفرمونية في مراقبة ظهور الحشرات وتطورها ويمكن أيضاً أن تستخدم علاجياً.

أخي الفلاح عند تأسيس بساتين الأشجار المثمرة تجنّب الزراعة بالأراضي المنخفضة حيث تتجمع المياه وتؤدي إلى تعفنات في الجذور وأمراض بالمستقبل.

عند القيام بعملية التقليم لا بد من اتخاذ الاحتياطات العامة التالية:

- استعمال أدوات تقليم حادة.
- تعقيم الأدوات المستخدمة في التقليم بين حين وآخر باستخدام معقم ملائم.
- استعمال شمع الماستيك في تغطية الجروح.
- التخلص من نواتج التقليم بعيداً عن الأشجار.
- استكمال جني محصول الملفوف والقرنبيط.
- تهيئة التربة ووضع السماد المناسب وفرز القزح استعداداً لزراعة البصل.

كانون الثاني

محاصيل

- استكمال زراعة القمح في حال تأخر الفلاح في الزراعة، ويمكن في المناطق الرئيسة لزراعة القمح أصناف قمح صائدة لمرض الصدأ للتنبؤ به فور ظهوره في الحقل.
- مكافحة الأعشاب في الأراضي التي زرعت بالقمح خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول.
- استكمال زراعة محصول العدس للأصناف المعتمدة والمغربية والمعقمة.
- استكمال زراعة الحمص الشتوي للأصناف المعتمدة والمغربية والمعقمة من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار عن طريق المصارف الزراعية.
- استكمال زراعة الفول بالمناطق الداخلية.

بستنة

- للحد من أضرار الصقيع الشتوي على أشجار الزيتون ننصح بتأخير التقليم في المناطق الداخلية وعدم إجراء التقليم





إضافة الأسمدة الأزوتية لمحصول الشعير في حال هطول الأمطار الكافية.

استكمال زراعة العدس.

بستنة

إضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتي لأشجار الحمضيات في النصف الثاني من هذا الشهر مع الأمطار وتعتبر هي الدفعة المهمة للنمو والإنتاج، على أن تضاف الثانية والثالثة في أيار وتموز مع مياه الري.

الصقيع خطر يهدد المزروعات ويسبب لها أضراراً وقد يقضي على الإنتاج نهائياً، ويمكن وقاية المزروعات بإشعال المواقد الحرارية بين المزروعات أو استخدام المراوح الخاصة بمكافحة الصقيع أو تشغيل شبكات الري بالريزات في حال توفرها وذلك عند اقتراب درجات الحرارة من الصفر المئوي.

استكمال زراعة العروة الربيعية للبطاطا.

استكمال زراعة العروة الصيفية للبندورة.

البدء بزراعة العروة الربيعية للفاصولياء اعتباراً من منتصف شهر شباط في المناطق الدافئة.

نصح الأخوة المزارعين في بيوت الزراعات المحمية باستخدام الشريط الأصفر اللاصق لاصطياد حشرة الذبابة البيضاء، وذلك ضمن إطار تطبيق مكافحة المتكاملة داخل البيت.

لإكثار نبات الوردة الشامية بالعقل يتم أخذ العقل القاسية بطول 20-30 / سم من النبات الأم وتجذيرها بهرمون التجذير وزراعتها برطوبة جوية لا تقل عن 90%.

إنتاج حيواني

عدم تعريض الحيوانات إلى التيارات الهوائية الباردة المباشرة ويفضل أن تكون فتحات التهوية في الحظائر في الأعلى وليست على مستوى ارتفاع الأبقار.

تستمر ولادات الماعز الشامي حتى شهر شباط.

تأمين ظروف رعاية مناسبة لتقليل تأثير العوامل البيئية وبالتالي تحسين إنتاج الحليب لدى نعاج العواس.

التقيد بزراعة أعداد الأشجار المذكرة والمؤنثة لشجرة الفستق الحلبي بمعدل 10\1.

البدء بزراعة العروة الربيعية للبطاطا بمنتصف الشهر حسب الظروف المناخية للمحافظات.

إنتاج حيواني

في الليالي الباردة ننصح الأخوة مربي الأبقار بتقديم الدريس والتبن ليلاً لكي تقوم الأبقار بأكلها واجترارها مما يبعث الدفء فيها، كما يجب الاهتمام بنظافة الفرشة وجفافها.

أخي مربي الماعز الشامي: تبدأ الولادات عادةً في هذا الشهر، وبعد الولادة تترك المواليد مع أمهاتها لمدة 4-5 أيام في حظيرة فردية لرعاية اللبأ، وكذلك إلزام العنزة بتبني مواليدها، وتبقى المواليد ترضع من أمهاتها لمدة 8/ أسابيع ثم تقطع جزئياً خلال أسبوعين، وبشكل كامل بعمر 2.5 شهر، ويقدم لها الدريس والعلف بشكل جيد.

نحل

أخي مربي النحل:

يجب تبخير الإطارات الشمعية المخزنة بزهر الكبريت /50 غ / م³ مع تهوية المستودع لإزالة الرطوبة منعاً لنمو الفطور، ويمكن استخدام حمض النمل ذو التركيز 60-80% بمعدل 50 سم³ لكل 5 عاسلات فوق بعض.

شباط

محاصيل

إضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتي (40%) في مرحلة الإشتاء للزراعة المتأخرة للقمح المروي و(60%) للقمح البعل، وبدء التحري عن بؤر الإصابات الأولية للأصداء على القمح والتنبؤ بها، واتخاذ الإجراءات السريعة المناسبة لمكافحتها.

الرش بسماد البورون في حال عدم إضافته قبل الزراعة للشوندر الخريفي ووصول النبات إلى مرحلة الورقة الحقيقية السادسة، وذلك بمعدل رشتين الفارق بينهما 15 يوماً.

بستنة

تعتبر العناصر الكبرى المغنيزيوم والكالسيوم والكبريت إضافة للعناصر الصغرى كالحديد والمنغنيز والزنك والنحاس والبورون والموليبدينوم والكوبالت من العناصر المعدنية الهامة في تطور ونمو أشجار الحمضيات وبالتالي في الإنتاج كمياً ونوعاً. تضاف هذه العناصر في حال نقصها على شكل شيلات أو كبريتات إلى التربة أو رشاً على الأوراق بالطريقة والكمية والزمن المناسب ويفضل سؤال المرشدين المختصين.

استكمال زراعة العروة الصيفية للبطاطا.

اتخاذ الإجراءات الوقائية لتلافي خطر الصقيع الربيعي وذلك بتهيئة المواعيد الحرارية وتوزيعها في حقلك من أجل استعمالها عند انخفاض درجات الحرارة وحدوث الصقيع كما يمكن استخدام أية طريقة أخرى متوفرة لديك مثل المراوح الهوائية والري بالذاد، ويحذر من حرق الإطارات المطاطية لها تسببه من أضرار على الإنسان والبيئة.

الاستمرار بزراعة العروة الربيعية للفاصولياء، وإجراء الترقيع بعد أسبوعين من الزراعة، وتضاف الدفعة الثانية من السماد الأزوتي قبل الإزهار مع الري الجيد للحقل.

إنتاج حيواني

تتم صناعة الدريس من الأعلاف والنباتات الخضراء وتجفف تحت أشعة الشمس أو بالهواء الساخن وتخزن لتقدم للحيوانات في موسم تندر فيه الأعلاف الخضراء.

تحلب الأبقار عادة من مرتين إلى 4 مرات يومياً.

نحل

أخي مربّي النحل: إن الفحص المبكر على الخلايا هام للتحري عن وجود إصابات أو رطوبة مخزنة، وإجراء تقييم للملكة واستبدالها عند الضرورة.

أخي المربي قبل قيامك بعملية حلب أبقارك عليك بغسل الضرع بالماء الفاتر بشكل جيد مع التنشيف وإجراء مساج خفيف مع وضع كمية من الأعلاف أمام البقرة.

أخي المربي عند ظهور حالة الاصراف بالأبقار يتم التلقيح خلال 12 ساعة.

نحل

أخي مربّي النحل: يجب مراقبة المنحل والطوائف خارجياً وإجراء الكشف عند الضرورة مع استخدام النباتات العطرية في المدخن لمكافحة الفاروا عند الفحص/زعتري - ننعن - كينا/.

آذار

محاصيل

إعطاء ريات تكميلية للزراعة البعل وتحري إصابات الصدا على القمح.

البدء بزراعة القطن في مناطق الغاب وحماة ابتداءً من 23 آذار ولغاية 10 نيسان.

متابعة تعشيب حقول الشوندر ومراقبة الآفات والأمراض خاصة حشرة الخنفساء البرغوثية ومكافحتها، وفلاحة عزيق للزراعة الخريفية المتأخرة.

نصح مزارعي الزراعات العضوية بتحضير الكومبوست، وهو مادة غنية بالمواد العضوية الناجمة عن تخمر البقايا النباتية والحيوانية بفعل البكتريا والكائنات الحية لفترة من الزمن. البدء بزراعة الحمص الربيعي.

إلى مزارعي الفول السوداني؛ يزرع الفول السوداني في المناطق الدافئة بدءاً من 15 آذار ولغاية 15 نيسان، ويعتبر هذا النبات من المحاصيل المخصصة للتربة ويدخل في الدورة الزراعية وخاصة عندما يزرع بعد محصول مجهد.

