








الجمهورية العربية السورية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي



دليل أصناف الزيتون في سورية



الجمهورية العربية السورية
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
مديرية الإرشاد الزراعي

دليل أصناف الزيتون في سورية

المادة العلمية

د. غادة قطمة

الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية-إدارة بحوث البستنة

المراجعة العلمية

م. عبير جوهر

مدير مكتب الزيتون

تدقيق وتنسيق

د. انتصار الجبائي

مدير الإرشاد الزراعي

رقم النشرة 21

دمشق 2023

المحتويات


الصفحة	العنوان
4	مقدمة
5	الأمر التي يجب مراعاتها عند اختيار صنف الزيتون الملائم للزراعة
6	ثانياً: خرائط أصناف الزيتون الملائمة حسب مناطق الزراعة في سورية
11	ثالثاً: مواصفات أصناف الزيتون
11	3-1- الصنف الصوراني
12	3-2- الصنف القيسي
13	3-3- الصنف الزيتي
14	3-4- الصنف الخضيري
15	3-5- الصنف الدعيبي
16	3-6- الصنف السكري
17	3-7- الصنف العيروني
18	3-8- الصنف الصفراوي
19	3-9- الصنف محزم أبو سطل
20	3-10- الصنف دان
21	3-11- الصنف سوري
22	3-12- الصنف مصعبي
23	3-13- الصنف الجلط الشامي
24	3-14- الصنف ماوي
25	رابعاً: تعريف ببعض المصطلحات الواردة في الدليل

مقدمة:

تتميز سورية بالتنوع الكبير بأصناف الزيتون المزروعة، فيوجد فيها ما يزيد عن 70 صنفاً، بعضها أصناف سائدة أو رئيسية، وأخرى أصناف قليلة الانتشار، والصنف السائد هو الصنف الذي تزيد نسبة زراعته وانتشاره في المحافظة عن 50% من إجمالي المساحة الكلية المزروعة بالزيتون.

يعتمد اختيار الصنف الملائم للزراعة في منطقة ما على تأقلمه مع الظروف البيئية من درجة حرارة ورطوبة وهطول مطري، وعلى تفضيل السكان لهذا الصنف، وتاريخ الصنف في المنطقة المنصوح بزراعته بها.

ويوضح الشكل (1) النسبة المئوية لعدد أشجار الزيتون المزروعة في المناطق السورية المختلفة.



الشكل (1): النسبة المئوية لعدد أشجار الزيتون المزروعة في المناطق السورية وفقاً للإحصائية الزراعية السنوية الصادرة عن وزارة الزراعة لعام 2020.

أولاً: الأمور التي يجب مراعاتها عند اختيار صنف الزيتون الملائم للزراعة:


- لا يكفي أن نختار الصنف المفضل للمستهلك وذو الإنتاجية العالية فحسب، فبعض الأصناف درجة تحملها للأمراض والآفات منخفضة، وتتسبب بحدوث عدوى للأصناف الأخرى وقد تنتشر جوائح يصعب معالجتها، لذا يفضل اختيار الصنف المنصوح بزراعته.
- تعد المحافظات الشرقية في سورية غير ملائمة لزراعة الزيتون، لكن يمكن زراعة أصناف الزيتون المنتشرة في تدمر، كالجلط التدمري ومحزم أبوسطل وأصناف أخرى متحملة للجفاف في المناطق التي تتوفر فيها المياه للري، كون معدل الهطول المطري غير كافٍ.
- يُفضل زراعة أكثر من صنف في البستان والمنطقة لأن الزيتون خلطي التلقيح، وهذا يقلل من ظاهرة تبادل الحمل (المعاومة) في بعض الأصناف، كما أن زراعة أكثر من صنف في البستان تضمن للمزارع الاستفادة من تعدد استخدامها (مائدة، إنتاج زيت).

أخي مزارع الزيتون:


بإمكانك التخفيف من ظاهرة المعاومة بتقديم عمليات الخدمة اللازمة من تسميد وتقليم والقطف بطرق سليمة، والمراقبة الدورية للأمراض والآفات التي قد تصيب الأشجار واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية المناسبة في الوقت المناسب.

ثانياً: خرائط أصناف الزيتون الملائمة حسب مناطق الزراعة في سورية:


يوضح الشكل (2) خارطة أصناف الزيتون الملائمة حسب مناطق الزراعة. وتبين الأشكال (3) و(4) خرائط أصناف الزيتون الملائمة في محافظتي اللاذقية وطرطوس على التوالي، كما تبين الأشكال (5) و(6) خرائط توزع أصناف الزيتون السائدة على مستوى المناطق الإدارية في محافظات حمص وحماه وحلب وإدلب على التوالي.




الشكل (2): خارطة أصناف الزيتون الملائمة حسب مناطق الزراعة.



الشكل (3): خارطة أصناف الزيتون الملائمة في محافظة اللاذقية



الشكل (4): خارطة أصناف الزيتون الملائمة في محافظة طرطوس



الشكل (5): خارطة توزيع أصناف الزيتون السائدة على مستوى المناطق الإدارية في محافظتي حمص وحماة



الشكل (5): خارطة توزيع أصناف الزيتون السائدة على مستوى المناطق الإدارية في محافظتي حلب وإدلب

صوراني



-قد يطلق عليه في بعض المناطق **معري**.
-تتركز زراعته في إدلب وحلب وينتشر أيضاً
في حماه وحمص والقنيطرة ودرعا والسويداء
والمنطقة الشرقية. يعد صنف ملائم للزراعة
في معظم البيئات السورية.

-صنف **ثنائي الغرض**.

-**الثمار**: بيضوية الشكل، متوسطة الوزن،
القمة مدببة، والقاعدة مبتورة، الحلقة غير
موجودة، القطر مركزي، العديسات عديدة
وصغيرة.

البذرة: متطاولة، ذات وزن متوسط إلى مرتفع، لها شوكة، وسطح خشن.
نسبة اللب/ البذرة: متوسطة.

نسبة الزيت (26 - 28%)، حمض الأوليك (68.15 - 69.10%)،

الموعد الأمثل للقطف: شهر تشرين الثاني.

يتميز الصنف بمواصفات إنتاجية عالية جداً، قليل الميل للمعاومة، يتحمل الجفاف والصقيع
 والملوحة.

حساس للإصابة بمرض الذبول، متحمل لحفار الساق ومرض عين الطاووس وسل الزيتون.

قيسي



-يطلق عليه أيضاً **خلخالي وخلو**.

- تتركز زراعته في حلب وينتشر في إدلب وحماه وحمص والسويداء ودرعا والقنيطرة والمنطقة الشرقية كونه صنف متحمل للجفاف.

-صنف **ثنائي الغرض**.

-**الثمار**: كروية إلى بيضوية، ذات وزن متوسط إلى مرتفع، وهو مرغوب كصنف مائدة ويستخدم للحشو بالجزر والزعتر.

القمة دائرية والقاعدة مبتورة، العديسات كبيرة وواضحة، الحلمة أثرية، القطر الأعظمي للثمرة في المركز.

البذرة: بيضوية، ذات وزن مرتفع، وسطح خشن جداً ولها شوكة.

نسبة اللب/ البذرة: جيدة.

نسبة الزيت: تتراوح نسبة الزيت بين (15.7 - 18.5%)، نسبة حمض الأوليك (70.2 - 72.4%).

الموعد الأمثل للقطف: نهاية شهر تشرين الثاني.

الصنف متحمل للبرودة والجفاف، تفضله ذبابة ثمار الزيتون كون ثماره كبيرة الحجم، لذا في حال وجود الذبابة ينصح بتحديد درجة النضج بالتنسيق مع الوحدات الإرشادية والتدخل بالمكافحة في الوقت المناسب.

زيتي



-يسمى أيضاً **كردي واخلالي**.

-تتركز زراعته في شمال حلب (جنديرس وعفرين)،
وموجود في إدلب وحمص وحماه ودرعا والسويداء.

-صنف **ثنائي الغرض**.

الثمار: كروية الشكل، متوسطة إلى منخفضة الوزن،
القمة دائرية، والقاعدة مبتورة، والحلقة غير موجودة،
العديسات كثيرة وعديدة، القطر الأعظمي مركزي.

البذرة: بيضوية الشكل، ذات وزن متوسط، سطحها
خشن، ولها شوكة.

نسبة اللب/ البذرة: متوسطة.

نسبة الزيت (27.2 - 31.2%)، حمض الأوليك (71.1 - 71.83%).

الموعد الأمثل للقطف: خلال شهر تشرين الثاني.

-صنف عالي الإنتاج، لكن شديد **المقاومة** وحساس للإصابة بالذبول وحفار ساق التفاح .
حساس للصقيع والجفاف.

-صنف عديم التوافق ذاتياً ويختلف موعد تفتح المآبر عن جاهزية المياسم لاستقبال حبوب الطلع
لذا نلاحظ وجود نسبة كبيرة من الثمار صغيرة بكرية العقد.

خضيري

- يسمى **خضراوي**.

-تتركز زراعته في محافظة اللاذقية، كما يتواجد في

طرطوس وغربي حمص وحماه والغاب.

-صنف **ثنائي الغرض**.

-**الثمار**: بيضوية متوسطة إلى منخفضة الوزن، القمة

مدببة، والقاعدة مبتورة، الحلمة غائبة. العديسات عديدة

وصغيرة.

البذرة: متطاولة مستدقة، ذات وزن مرتفع، السطح

ناعم، ولها شوكة.

نسبة اللب/ البذرة : متوسطة إلى منخفضة.

-نسبة الزيت (25-27%)، حمض الأوليك (70.3-71.3%).

الموعِد الأمثل للقطف: خلال شهر تشرين الأول.

وهو صنف ذو صفات إنتاجية جيدة إنتاجه عالي و**قليل المقاومة**، حساس للإصابة بمرض عين الطاووس

وذباب ثمار الزيتون، **غير متحمل للجفاف والصقيع** كونه يزرع بالمنطقة الساحلية.



دعيلي



له أسماء محلية أخرى **درملالي، خوخاني، تمراني**

يتواجد بشكل رئيس في محافظة طرطوس، كما يُزرع

في اللاذقية وغربي حماه وريف حمص ودرعا.

صنف ثنائي الغرض.

-الثمار: كروية، متوسطة الوزن، القمة دائرية،

القاعدة مبتورة، القطر الأعظمي للثمرة مركزي،

العديسات عديدة وصغيرة، الحلمة غائبة.

البذرة: بيضوية، ذات وزن مرتفع، لها شوكة صغيرة، وسطح خشن.

-نسبة اللب/ البذرة: قليلة إلى متوسطة.

-نسبة الزيت (21-25%)، حمض الأوليك (69.6-69.8%).

الموعد الأمثل للقطف: النصف الثاني من شهر تشرين الأول إلى بداية تشرين الثاني.

حساس للإصابة بمرض عين الطاووس، وتفضل ذبابة ثمار الزيتون صنف دعيلي لأن ثماره مبكرة النضج.

هو صنف مرغوب لصفاته الإنتاجية الجيدة، إلا أنه **شديد المقاومة**، وغير متحمل لظروف الجفاف وللصقيع.

سكري

-نشأ هذا الصنف في قرية السكرية في منطقة صافيتا بريف طرطوس.

صنف ثنائي الغرض.



الثمار: بيضوية، الوزن متوسط، القطر الأعظمي مركزي، القمة دائرية، القاعدة دائرية، العديسات صغيرة الحجم، قليلة العدد، الحلمة غائبة.

البذرة: متطاولة، وزنها متوسط، سطحها خشن جداً، لها شوكة.

نسبة اللب/ البذرة: مرتفعة.

نسبة الزيت بين (20-23%) .

مبكر النضج يبدأ بالنضج الأخضر في شهر أيلول.

صنف قليل الميل للمعاومة، متحمل لمرض عين الطاووس ، والذبول، حساس لسيل الزيتون.

حبيروني

ينتشر في منطقة صافيتا بمحافظة طرطوس.

صنف ثنائي الغرض.



الثمار: بيضوية الشكل، ذات وزن متوسط، القمة دائرية، القاعدة مبتورة، لا يوجد حلمة، العديسات عديدة متوسطة الحجم، القطر الأعظمي مركزي.

البذرة: بيضوية الشكل، متوسطة في وزنها، السطح خشن جداً ، ولها شوكة.

نسبة اللب/ البذرة: متوسطة.

نسبة الزيت (22-24%)، حمض الأوليك (65.31%).

الموعد الأمثل للقطف في شهر تشرين الثاني.

غير متحمل للصقيع والجفاف، متحمل لمرض عفن الطاووس، متحمل للذبول.

صفراوي

تتركز زراعته في غربي حماه بمنطقة مصياف،

وكذلك في صافيتا وطرطوس وبعض مناطق ريف

حمص.



الصنف ثنائي الغرض

الثمار: متطاولة ذات وزن مرتفع، القمة دائرية،

القاعدة مبتورة، الحلقة غائبة، القطر الأعظمي

مركزي. العديسات عديدة وصغيرة.

البذرة: متطاولة مستدقة، ذات وزن مرتفع جداً، لها شوكة صغيرة، سطحها خشن.

نسبة اللب/ البذرة: متوسطة.

نسبة الزيت (18-20%)، حمض الأوليك (69.4-70.5%).

الموعد الأمثل للقطف خلال شهر تشرين الثاني.

إنتاجيته عالية لكنه **معاوم**، يتحمل الجفاف والصقيع، ثماره مفضلة لذبابة ثمار الزيتون، وعند

وجود انتشار للذبابة ينصح بالتبكير بالقطف.

محزم أبو سطل

تنتشر زراعته في محافظة حمص (منطقة تدمر)
وحماه ودرعا.



سمي بهذا الاسم بسبب ظهور حزام في وسط
الثمرة في بداية نضجها.

صنف **مائدة** يستخدم للتخليل الأخضر والأسود.

الثمار: بيضوية، ذات وزن مرتفع، القمة مدببة،
القاعدة دائرية، العديسات عديدة وواضحة،
القطر الأعظمي باتجاه القاعدة، الحلمة أثرية.

البذرة: متطاولة، ذات وزن مرتفع، سطحها خشن ولها شوكة.
نسبة اللب/ البذرة: مرتفعة.

نسبة الزيت بين (9 و 12%)، نسبة حمض الأوليك (69.36%).

الموعد الأمثل للقطف: النصف الثاني من شهر تشرين الأول إلى منتصف تشرين الثاني.

صنف قليل المقاومة، متحمل للكلس، لا يتحمل الجفاف والصقيع، حساس للذبول.

دان

تتركز زراعته بشكل أساسي في ريف دمشق،
إضافة لدرعا والسويداء والقنيطرة.

صنف ثنائي الغرض.



الشمار: متطاولة، متوسطة الحجم، القمة دائرية،
القاعدة مبتورة، القطر الأعظمي للثمرة باتجاه
القمة، العديسات عديدة وصغيرة، والحلمة غير
موجودة.

البذرة: متطاولة، ذات وزن متوسط، لها شوكة،
وخشنة الملمس.

نسبة اللب/البذرة: متوسطة.

نسبة الزيت (25-28%)، نسبة حمض الأوليك (71%).

الموعد الأمثل للقطف في نهاية شهر تشرين الثاني.

يتميز صنف الدان بإنتاجية عالية، **ومعاوم** إلا أنه يمكن التخفيف من ظاهرة المعاومة بتطبيق العمليات
الزراعية الصحيحة، يتحمل البرد والجفاف، أكثر تحملاً للذبول وحساس للإصابة بالعثة.

سوري



يسمى **بلدي**.

تتركز زراعته في ريف دمشق ودرعا.

صنف **ثنائي الغرض**.

الثمار: بيضوية الشكل، متوسطة الوزن، ذات

قمة مدببة، وقاعدة مبتورة، الحلمة أثرية،

العديسات عديدة واضحة، القطر الأعظمي

مركزي.

البذرة: ذات شكل مستدق، الوزن مرتفع، السطح

خشن ولها شوكة.

نسبة اللب/ البذرة: متوسطة.

نسبة الزيت (20 %)، نسبة حمض الأوليك (72.6 - 72.75 %).

الموعد الأمثل للقطاف النصف الثاني من شهر تشرين الثاني.

صنف إنتاجيته عالية، **متوسط المقاومة**، متحمل للجفاف والبرودة. حساس لمرض الذبول، متحمل

للإصابة بحفار ساق التفاح.

مصعبي

ينتشر بشكل رئيسي في محافظة ريف دمشق.

صنف **مائدة**، يصلح للتكليس الأخضر.

الثمار: متطاولة، وزن الثمرة مرتفع جداً، القطر الأعظمي مركزي، القمة مدببة، القاعدة دائرية.

العديسات عديدة كبيرة الحجم، الحلمة واضحة.

البذرة: متطاولة، ذات وزن مرتفع، وسطحها

خشن ولها شوكة.

نسبة اللب/ البذرة: متوسطة.

نسبة الزيت (13.6%)، نسبة حمض الأوليك (67.39%).

موعد القطف للتخليل الأخضر خلال شهر تشرين الأول.

يتحمل الجفاف والصقيع، متوسط الميل للمعاومة، متحمل للذبول.



جلط شامي

ينتشر بشكل أساسي في ريف دمشق.

صنف **مائدة** يستخدم للتخليل ولتحضير زيتون

العتون (إحدى طرائق تحضير زيتون المائدة).

الثمار: متطاولة، ذات وزن مرتفع جداً، القطر

الأعظمي مركزي، العديسات كثيرة وصغيرة، القمة

دائرية، القاعدة دائرية، الحلمة غائبة.

البذرة: متطاولة، كبيرة ذات وزن مرتفع.

نسبة اللب/ البذرة: مرتفعة.

نسبة الزيت (9-12%)، حمض الأوليك (51.21%).

موعد القطف للتخليل الأخضر في شهر تشرين الأول وللتخليل الأسود في منتصف شهر تشرين

الثاني وحتى بداية كانون الأول.

يتحمل الجفاف والصقيع، متوسط الميل للمعاومة، حساس للذبول.



ماوي

ينتشر في ريف دمشق ودرعا.

صنف ثنائي الغرض.



الثمار: بيضوية الشكل، وزنها متوسط، القمة

دائرية القاعدة دائرية، القطر الأعظمي مركزي

الحلمة غائبة، العديسات كثيرة وصغيرة الحجم.

البذرة: مستدقة الشكل، ذات وزن مرتفع،

سطحها ناعم، ذات شوكة.

نسبة اللب/ البذرة: متوسطة.

نسبة الزيت (10-12%)، حمض الأوليك (69.07%).

الموعد الأمثل للقطف خلال شهر تشرين الثاني.

لايتحمل الجفاف متحمل للصقيع، **معاوم**، حساس لمرض الذبول.

رابعاً: تعريف ببعض المصطلحات الواردة في الدليل:

- **صنف ثنائي الغرض:** يستخدم لإنتاج الزيت وكصنف مائدة للأكل.
- **نسبة اللب/ البذرة:** هي مؤشر لسماكة اللحم أو اللب وبالتالي كلما كانت مرتفعة كان الصنف مرغوباً للاستهلاك كصنف مائدة.
- **حمض الأوليك:** هو الحمض الدهني الأساسي في زيت الزيتون يعطي الزيت صفة الثباتية أثناء التخزين عند وجود شروط جيدة للتخزين (رطوبة، إضاءة، حرارة).
- **قمة الثمرة:** هي الطرف الخارجي للثمرة.
- **قاعدة الثمرة:** هي الطرف الملتصق بعنق الثمرة أو الحامل على الشجرة.
- **القطر الأعظمي للثمرة:** هو العرض الأقصى للثمرة.
- **الحلقة:** هي نتوء في قمة الثمرة قد تكون واضحة أو أثرية أو غائبة في أصناف الزيتون.
- **العديسات:** هي نقط موزعة على الثمرة وتلاحظ عندما تكون الثمار خضراء.
- **خط الالتحام:** هو خط على جانبي الثمرة قد يكون واضح أو قليل الوضوح حسب الصنف.
- **المقاومة:** هي ظاهرة وراثية يقصد بها تناوب الحمل بين السنوات (سنة حمل غزير، وسنة حمل خفيف)، وتختلف الفروقات باختلاف الصنف والعوامل البيئية وعمليات الخدمة المقدمة.